

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 13-10-64 349388  
BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 72-58-72)

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 16, rue de la République - MONTPELLIER.

C. C. P. : MONTPELLIER 5.238-57

N° 49 - OCTOBRE 1964

## TRAITEMENTS D'AUTOMNE DES ARBRES FRUITIERS

La chute des feuilles à l'automne, crée de multiples cicatrices par lesquelles pénètrent divers parasites que les traitements d'automne peuvent arrêter. Des maladies cryptogamiques (Cloque, Coryneum), des maladies bactériennes du cerisier et du poirier, nécessitent des traitements automnaux sur les espèces auxquelles elles sont inféodées.

CLOQUE : Bien que les traitements de fin d'hiver (pré-débourrement) soient plus efficaces que les pulvérisations d'automne, ces dernières ont une utilité certaine et leur réalisation est indispensable dans les pépinières.

CORYNEUM : Cette maladie s'installe sur tous les arbres fruitiers à noyau. Certaines variétés de pêcher, le cerisier, sont particulièrement sensibles et l'on observe parfois sur des feuilles de multiples taches rondes, rougeâtres, puis brunes, qui se dessèchent et amènent la perforation de l'épiderme.

Sur fruit la maladie est parfois visible sur pêches tardives, mais ce sont surtout les abricots qui souvent sont mouchetés de points ligneux à la suite d'une attaque de coryneum.

Les jeunes rameaux portent parfois des taches près de l'insertion des feuilles, brunâtres, qui donnent naissance à des chancres et à des écoulements de gomme.

Par temps sec traiter les arbres fruitiers à noyau avec une bouillie bordelaise neutre à 2 %. On peut également employer des bouillies cupriques de fabrication industrielle à la condition qu'elles possèdent une bonne persistance.

Sur pêcher, faire ce traitement seulement à la chute des feuilles.

MALADIE BACTERIENNE DU CERISIER : Cette maladie, qui entre autre empêche le débourrement des bourgeons au printemps ou provoque le dessèchement des fleurs, ainsi que la formation de chancre et des exsudations de gomme, doit obligatoirement être combattue à l'automne par deux pulvérisations de bouillie bordelaise ; la première à 1% deux semaines avant le début de la chute des feuilles ; la seconde à 1,5% lorsque la totalité des feuilles est tombée.

MALADIE BACTERIENNE DU POIRIER : Une maladie bactérienne (*Pseudomonas syringae*) semble se répandre de plus en plus dans notre région en provoquant le dessèchement des pousses. Il faut à la chute des feuilles pulvériser une bouillie bordelaise à 2 %.

ZEUZERE : En rappel de notre précédent bulletin, il est utile de continuer d'assurer la protection, l'insecte poursuivant son activité.

Les Contrôleurs,  
L.L. TROUILLON M. BEZUT

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

Imprimerie de la Station du Languedoc - Roussillon. Le Directeur Gérant : L. BOUYX